

# Maxitec

Comprimidos



meloxicam **0,5mg** **2mg**

Anti-inflamatório

Analgésico

Antipirético

Comprimidos palatáveis  
Uso veterinário

**Indicação:**  
Casos de febre,  
inflamação, dor leve a  
moderada e afecções  
musculoesqueléticas

Para:  
Cães e gatos



**Fórmula:**

Composição	0,5mg	2,0mg
Meloxicam	0,5mg	2,0 mg
Excipiente q.s.p.	100 mg	400 mg

## Indicações de uso:

Maxitec é indicado no tratamento de afecções musculoesqueléticas em cães e gatos, tais como osteoartrites, displasia coxofemoral, luxações, fraturas, tendinites, espondilose e doenças degenerativas nas articulações. Também é utilizado no controle da dor pré e pós-cirúrgica, ajudando na redução da inflamação e alívio da dor associada a essas condições.

## Modo de usar e posologia:

O comprimido deve ser administrado via oral, uma vez ao dia, conforme a dosagem indicada na tabela a seguir:

### Dosagem para Gatos adultos e filhotes

Maxitec	0,5 mg
PRIMEIRO DIA DE TRATAMENTO 0,1mg de meloxicam/kg de peso corporal	1 comprimido para cada 5 kg de peso
SEGUNDO DIA DE TRATAMENTO POR MAIS ATÉ 4 DIAS 0,05 mg de meloxicam/kg de peso corporal	Meio comprimido para cada 5 kg de peso

### Dosagem para Cachorros adultos

Maxitec	0,5 mg	2,0 mg
PRIMEIRO DIA DE TRATAMENTO 0,2 mg de meloxicam/kg de peso corporal	2 comprimidos para cada 5 kg de peso	2 comprimidos para cada 20 kg de peso
SEGUNDO DIA DE TRATAMENTO POR MAIS ATÉ 14 DIAS 0,1 mg de meloxicam/kg de peso corporal	1 comprimido para cada 5 kg de peso	1 comprimido para cada 20 kg de peso

### Dosagem para Cachorros filhotes

Maxitec	0,5 mg	2,0 mg
PRIMEIRO DIA DE TRATAMENTO 0,2 mg de meloxicam/kg de peso corporal	2 comprimidos para cada 5 kg de peso	2 comprimidos para cada 20 kg de peso
SEGUNDO DIA DE TRATAMENTO POR MAIS ATÉ 6 DIAS 0,1 mg de meloxicam/kg de peso corporal	1 comprimido para cada 5 kg de peso	1 comprimido para cada 20 kg de peso

A duração do tratamento será determinada pela gravidade do quadro clínico. Em casos agudos, o tratamento deve ter duração de 3 a 5 dias. Já em casos crônicos, o tratamento pode ser mais longo, chegando a 15 dias. É importante ressaltar que, em gatos, o tratamento não deve ultrapassar 5 dias consecutivos.

105 mm

## Precauções:

Para garantir a segurança e efeitos desejados, deve-se seguir as dosagens e via de administração indicadas para o uso do produto. Em caso de dúvidas ou necessidade de alterações de dosagens, consulte o médico-veterinário.

## Contraindicações e limitações de uso:

**O produto é contraindicado em animais com histórico de hipersensibilidade ao meloxicam.**

**A administração é contraindicada em cadelas e gatas gestantes no último terço da gestação ou em lactação.**

**A administração é contraindicada em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais graves.**

**O produto é contraindicado em casos de intoxicação por anticoagulantes.**

**A administração é contraindicada em animais com suspeita de úlcera gastrointestinal, distúrbios hemorrágicos ou hipersensibilidade ao produto.**

**A administração do medicamento não deve exceder 15 dias em cães.**

**A administração do medicamento não deve exceder 5 dias em gatos.**

**A utilização não é recomendada em filhotes com menos de 4 meses.**

## Reações adversas:

Podem ser observados desconforto gastrointestinal, vômitos, fezes amolecidas, diarreia e inapetência. Estas reações são transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou final do tratamento. Caso o animal apresente qualquer reação descrita acima, é recomendado suspender o uso e procurar um médico veterinário.

## Interações medicamentosas:

**Não administrar juntamente com:**

- Anticoagulantes (Ex: Heparina): aumentam a chance de sangramento.
- Aspirina e outros AINEs: podem aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (Ex: ulceração, sangramento, vômito, diarreia).
- Corticosteroides: podem aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (Ex: ulceração, sangramento, vômito, diarreia).
- Drogas nefrotóxicas (Ex: Furosemida) pode aumentar o risco de nefrotoxicidade.

## Informações para uso do médico veterinário:

Meloxicam: fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE) da classe dos oxicams, sem antídoto específico. Em caso de intoxicação, o tratamento é sintomático.

## Informações técnicas:

O meloxicam é um fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE) pertencente ao grupo dos ácidos enólicos. Inibe a síntese de prostaglandinas E2 e consequentemente os efeitos construtivos da ciclo-oxigenase. Possui propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas, analgésicas e antiexsudativas. Em comparação com vários outros AINEs testados, o meloxicam demonstrou ser o inibidor mais seletivo da ciclo-oxigenase induzível. É considerado COX-2 preferencial.

## Apresentação

Cartucho contendo um blister com 10 comprimidos bisulcados.

## Modo de conservação

Conservar o produto em sua embalagem original, à temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta, calor e umidade.

## Validade:

02 (dois) anos após a data de fabricação, se mantido na embalagem original inviolada.

**MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS  
VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura e Pecuária sob o número 06/2026 em 21/01/2026. A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

**Responsável técnica**  
Dra. Vera de Fatima Costa Calixto, CRF-SP nº 11.427

**Proprietário e fabricante: SYNTEC DO BRASIL LTDA**  
Estrada Rosa Scarpa, nº 178, Votuparim, CEP: 06513-010  
Santana de Parnaíba, SP.  
CNPJ: 02.177.011/0001-77 (SP 000200-3)



**WHATSAC**  
**1198763-0145**

sac@syntec.com.br  
www.syntec.com.br

220 mm

26mm dobra

26mm dobra

26mm dobra

26mm dobra

26mm dobra

26mm dobra

26mm dobra

REFERÊNCIAS TÉCNICAS E CRIAÇÃO

Cliente: Syntec

12/03/2026

Nº Protocolo: BR12125

Software: OC

Arquivo: Bula Maxitec Comprimidos

Adobe®Illustrator®

Cores



Responsável: Derik Stafask

**CALL12**Health  
creative strategy