

Dobra  
Corte  
Sangria

105mm

**Maxitec<sup>Oral</sup>**  
**Meloxicam**

**Anti-inflamatório, Analgésico e Antipirético para cães e gatos.**  
**USO VETERINÁRIO**  
**Suspensão Oral**

**AGITE ANTES DE USAR.**

**FÓRMULA:**  
Cada 100 mL contém:  
Meloxicam ..... 0,1 g  
Veículo q.s.p. .... 100,0 mL

**MECANISMO DE AÇÃO:**  
O meloxicam, fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE), pertence ao grupo dos ácidos enólicos. Inibe a síntese de prostaglandinas E2 inibindo os efeitos construtivos da ciclo-oxigenase. Possui propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas e analgésicas. Em comparação com vários outros AINEs testados, o meloxicam demonstrou ser o inibidor mais seletivo da ciclo-oxigenase induzível. É considerado COX-2 preferencial (mas não COX-2 específico).

**INDICAÇÕES:**  
**MAXITEC<sup>ORAL</sup>** é indicado para cães e gatos a partir de 4 semanas de vida no tratamento da inflamação aguda e febre e dor associados.

**VIA DE ADMINISTRAÇÃO, POSOLOGIA E MODO DE USAR:**  
O produto deve ser aplicado pela via oral, após vigorosa agitação, diretamente na boca do animal, com auxílio da seringa dosadora, nas seguintes doses e posologia:

**CÃES ADULTOS:** dose inicial de 0,2 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 2,0 mL do produto para cada 10 kg de peso vivo no primeiro dia, seguida da dose de 0,1 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 1,0 mL do produto para cada 10 kg de peso vivo, por mais 4 a 14 dias consecutivos.

**CÃES FILHOTES:** dose de 0,2 ml do produto/kg de peso vivo, em dose única no primeiro dia e 0,1 mg de meloxicam/kg de peso vivo, equivalente a 0,1 ml do produto/kg de peso vivo, durante 14 dias consecutivos com intervalo de 24 horas.

**GATOS ADULTOS:** dose inicial de 0,1 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 1,0 mL do produto para cada 10 kg de peso vivo no primeiro dia, seguida da dose de 0,05 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 0,5 mL do produto a cada 10 kg de peso vivo, por mais 2 a 4 dias consecutivos.

**GATOS FILHOTES:** dose de 0,1 mL do produto/kg de peso vivo, em dose única no primeiro dia e 0,05 mg de meloxicam/kg de peso vivo, equivalente a 0,05 mL do produto/kg de peso vivo, durante mais 4 dias consecutivos com intervalo de 24 horas.

A posologia e modo de usar poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

**CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:**

- Animais que apresentem hipersensibilidade ao meloxicam;
- Não deve ser usado em animais com ulceração gastrointestinal ativa ou sangramento;
- Deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência hepática, cardíaca ou renal e distúrbios hemorrágicos;
- Não utilizar em animais com menos de 12 meses;
- Não utilizar em fêmeas gestantes ou lactantes.

175mm

26mm

26mm

26mm

26mm

26mm

26mm

26mm

**EFEITOS COLATERAIS:**

Durante os estudos para determinação da segurança clínica do produto Maxitec Oral em cães e gatos, não foram observadas reações adversas, nem mesmo quando administrada o triplo da dose. Portanto, não são esperados efeitos colaterais se o produto for usado conforme indicado.

Podem ser evidenciados desconforto gastrointestinal, vômitos, fezes moles, diarreia e inapetência. Estas reações são transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou final do tratamento. Caso o animal apresente qualquer reação adversa, suspenda o uso e procure um médico veterinário.

**PRECAUÇÕES:**

- Agitar vigorosamente antes de usar, pois é uma suspensão;
- Aplicar somente por via oral;
- Os animais devem ser pesados antes da aplicação para administrar a posologia adequada;
- Manter a embalagem fechada;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Ler a bula atentamente;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Produto seguro quando utilizada sobredose de até 3 vezes a dose indicada.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:**

- Anticoagulantes (por exemplo, heparina, varfarina, etc.): aumentam a chance de sangramento;
- Aspirina e outros AINEs: podem aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (por exemplo, ulceração, sangramento, vômito, diarreia);
- Corticosteroides: pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (por exemplo, ulceração, sangramento, vômito, diarreia);
- Drogas nefrotóxicas (por exemplo, furosemida, aminoglicosídeos, anfotericina b, etc.): pode aumentar o risco de nefrotoxicidade.

**MODO DE CONSERVAÇÃO:**

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

**APRESENTAÇÃO:**

Frascos de vidro âmbar de 20 mL acondicionados em cartucho individual.

**MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob nº SP 000200-3.000015 em 08/11/2022.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP nº 11.427

**PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:**

Syntec do Brasil Ltda.  
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim  
Santana de Parnaíba/SP  
CEP: 06513-010  
CNPJ: 02.177.011/0001-77  
Indústria Brasileira



**FICHA TÉCNICA  
IMPRESSÃO**

PRODUTO: Bula - Maxitec Oral  
CLIENTE: Syntec  
CÓDIGO DO PROJETO: --  
EAN 13 CÓD DE BARRAS: Não se aplica  
APRESENTAÇÃO DO PROD: Bula

SOFTWARE: Adobe Illustrator  
NÚMERO DE CORES:  
DIMENSÕES: 105mm x 175mm  
FONTES: Frutiger Neue

REF. DE COR: Black

SUBSTRATO: Papel 63g

ACABAMENTO Dobras

DATA: 24/09/2023 16:20  
SOLICITAÇÃO: Assuntos regulatórios  
VERSÃO REV: Rev - 1  
DESIGNER: Wendrell - loon  
VERSÃO FINAL: VS - 05

ALTERAÇÃO: Alteração de dizeres

BOBINAMENTO: • Não se aplica

VALIDAÇÃO MKT. --

VALIDAÇÃO AR. --

CÓDIGO POTE Não se aplica

CÓDIGO CARTUCHO Não se aplica

OUTROS Não se aplica

- | Salvo exceções especificadas no documento, todas as letras devem ter altura mínima de 1,2mm.
- | Espaço de codificação na horizontal. (QUANDO APLICÁVEL)
- | O tamanho do rótulo está em conformidade?
- | O acabamento do rótulo é o correto?
- | O tipo de material do rótulo é o especificado no projeto?
- | Dentro de normas fornecidas pelo área regulatória.
- | Indicações de bobinamento quando Sachês, rótulos e pouch.
- | Fotocélula em contraste quando rótulos, sachês e pouch.
- | Quando cartucho, se atentar para fechamento.
- | Outros.