

MAXITEC[®]

INJETÁVEL
Meloxicam 3%

USO VETERINÁRIO

Anti-inflamatório, analgésico e antipirético para BOVINOS e EQUINOS.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Meloxicam 3,0 g

Veículo q.s.p. 100,0 mL

MECANISMO DE AÇÃO

O meloxicam, fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE), pertence ao grupo dos ácidos enólicos. Inibe a síntese de prostaglandina E2 inibindo os efeitos constitutivos da ciclo-oxigenase. Possui propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas e analgésicas. Em comparação com vários outros AINEs testados, o meloxicam demonstrou ser o inibidor mais seletivo da ciclo-oxigenase induzível. É considerado COX-2 preferencial (mas não COX-2 específico).

INDICAÇÕES

MAXITEC INJETÁVEL é indicado para BOVINOS e EQUINOS, no tratamento da inflamação aguda, febre e dor associados.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no entanto, a Syntec do Brasil realizou e apresentou os estudos que comprovam a eficácia e segurança indicadas em bula, obtendo-se a licença provisória para a comercialização.

POSOLOGIA

O produto é uma solução injetável pronta para uso, que deve ser administrado pela via intravenosa ou subcutânea, de acordo com a indicação abaixo:

Bovinos

Via intravenosa – 1 mL para cada 60 kg de peso vivo (0,5 mg de Meloxicam por Kg de peso corporal).

Via subcutânea – 1 mL para cada 60 kg de peso vivo (0,5 mg de Meloxicam por Kg de peso corporal).

Equinos

Via intravenosa - 2,0 mL para cada 100 kg de peso vivo (0,6 mg de Meloxicam por Kg de peso corporal).

A posologia e modo de usar poderão ser alterados a critério do médico veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

- Animais que apresentem hipersensibilidade ao meloxicam
- Não deve ser usado em animais com ulceração gastrointestinal ativa ou sangramento.
- Deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência hepática, cardíaca ou renal e distúrbios hemorrágicos.
- Usar com cuidado em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, pois há um potencial risco aumentado de desenvolvimento de toxicidade renal.
- Não utilizar em animais com menos de 15 meses
- Não utilizar em fêmeas gestantes ou lactantes.
- Não usar em animais destinados ao abate para consumo humano.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS:

INTRAVENOSA:

ABATE - 11 DIAS APÓS APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO.

LEITE - 4 DIAS APÓS A APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO.

SUBCUTÂNEA:

ABATE - 11 DIAS APÓS A APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO.

LEITE - 5 DIAS, APÓS A APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO.

EQUINOS:

ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

REAÇÕES ADVERSAS

Os estudos realizados para determinação da segurança clínica do produto Maxitec Injetável em Equinos e Bovinos, não foram observadas reações adversas. Portanto, não são esperados efeitos colaterais se o produto for usado conforme indicado.

Podem ser evidenciados desconforto gastrointestinal, vômitos, fezes moles, diarreia e inapetência. Estas reações são transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou final do tratamento. Caso o animal apresente qualquer reação adversa, suspensa o uso e procure um médico veterinário.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- Anticoagulantes (por exemplo, heparina, varfarina, etc.): aumentam a chance de sangramento
- Aspirina e outros AINEs: pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (por exemplo, ulceração, sangramento, vômito, diarreia)
- Corticosteroides: pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (por exemplo, ulceração, sangramento, vômito, diarreia)
- Drogas nefrotóxicas (por exemplo, furosemda, aminoglicosídeos, anfotericina b, etc.): pode aumentar o risco de nefrotoxicidade

PRECAUÇÕES

- Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto
- Aplicar somente pelas vias indicadas do produto
- Os animais devem ser pesados antes da aplicação para administrar a posologia adequada.
- Manter a embalagem fechada
- Não reutilizar as embalagens vazias
- Ler a bula atentamente
- MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS

APRESENTAÇÃO

Frascos ampola de vidro de 50 mL acondicionados em cartucho individual.

MODO DE CONSERVAÇÃO

Conservar o produto em sua embalagem original, a temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta, calor e umidade.

VALIDADE

- 02 (dois) anos após a data de fabricação, se mantido em embalagem original inviolada. Vide impressão no rótulo e cartucho sobre fabricação e lote.
- 30 (trinta) dias após a abertura e primeiro uso, se mantido em sua embalagem original.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob nº 399/2019 em 30/12/2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto – CRF/SP nº 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

SYNTEC DO BRASIL LTDA.

Estrada Rosa Scarpa, 178 – Votuparim – Santana de Parnaíba – SP

CEP: 06513-010 – CNPJ: 02.177.011/0001-77

INDÚSTRIA BRASILEIRA



(11) 4702-5425
sac@syntec.com.br
www.syntec.com.br

