

Apromazin

Maleato de Acepromazina 1%

Uso Veterinário Solução Oral

AÇÃO: Neuroléptico, Tranquilizante e Pré-Anestésico para cães e gatos.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Maleato de Acepromazina 1,0 g

Veículo aquoso q.s.p. 100,0 mL

INDICAÇÃO DE USO: Neuroléptico, tranquilizante, contudo a sua principal aplicação é como pré-anestésico em cães e gatos. Ela confere potencialização acentuada dos barbitúricos, facilitando a manipulação e a contenção dos animais.

FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA: Seu mecanismo de ação envolve o bloqueio dos receptores nervosos da dopamina no cérebro; causando conseqüente sedação, relaxamento muscular e também um efeito antiemético.

A droga é metabolizada no fígado e seus metabólitos conjugados e não conjugados são excretados na urina.

A tranquilização dos animais, em geral, persiste por 6 a 10 horas. Acepromazina é considerada muito segura. A dose tóxica é 20 vezes maior do que a dosagem recomendada.

APLICAÇÃO E POSOLOGIA:

Em cães e gatos é administrado de 1 a 3 gotas / kg por via oral, sendo aplicado diretamente na boca ou com um pouco de leite ou água.

PRECAUÇÕES: Os tranquilizantes são depressores potentes do sistema nervoso central e podem causar sedação seguida de supressão do sistema nervoso simpatomimético. Podem produzir efeito prolongado na depressão ou inativação do sistema motor quando fornecidos a animais sensíveis. Como outros derivados da fenotiazina, a Acepromazina intoxica o fígado, portanto, deve ser usado com cautela em animais com um histórico de disfunção renal ou leucopenia.

CONTRAINDICAÇÕES: A droga é contraindicada na maioria dos tipos de choque, podendo resultar na queda crítica da pressão arterial e no retorno venoso. Também é contraindicada em caso de deficiência circulatória ou insuficiência circulatória aguda e em animais susceptíveis a convulsões ou naqueles submetidos a procedimentos mielográficos.

A Acepromazina pode potencializar a toxicidade dos organofosforados, portanto deverá ser evitada para controlar os tremores associados com o envenenamento orgânico do fosfato.

E é absolutamente contraindicado misturar glicopirrolato e fenotiazinas ou diazepam.

APRESENTAÇÕES:

Frasco de 10 mL e 30mL contendo solução oral de Maleato de Acepromazina 1%.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15° C a 30° C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO,
COM RETENÇÃO OBRIGATORIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.**

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE.

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob o n° 7.598 em 27/12/2000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto CRF/SP n° 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Syntec do Brasil Ltda.

Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim

Santana de Parnaíba/SP

CEP 06513-010

CNPJ:02.177.011/0001-77

Indústria Brasileira