

# CIPERDUO®

## FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina.....5,0g  
Butóxido de piperonila.....1g  
Veículo q.s.p.....100mL

## MECANISMO DE AÇÃO:

**CIPERDUO** possui em sua formulação a cipermetrina, ectoparasiticida de amplo espectro de ação, pertencente ao grupo dos piretroides, atua primariamente modulando a cinética de abertura dos canais de sódio dos nervos, resultando em descargas repetitivas ou na despolarização da membrana e subsequente morte dos parasitas. O butóxido de piperonila aumenta o período de ação da cipermetrina inibindo as enzimas oxidativas e hidrolíticas responsáveis por sua degradação.

## INDICAÇÕES:

**CIPERDUO** é indicado como:

- Carrapaticida: Elimina larvas e ninfas; machos e fêmeas, e interfere na postura de ovos férteis do *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.
- Mosquicida: Repele a *Haematobia irritans* (mosca do chifre), as moscas vetoras da *Dermatobia hominis* (larva da mosca do berne), *Stomoxys calcitrans* (mosca do estábulo) e mosca doméstica, controlando preventivamente as infestações por berne bovino.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR:

**CIPERDUO** deve ser aplicado de acordo com a seguinte tabela de dosagem:

PESO DOS ANIMAIS(Kg)	VOLUME DO PRODUTO (mL)
100	10
200	20
300	30
400	40
500	50

## Dose máxima: 50mL

Pressione o frasco de **CIPERDUO** para que o produto passe para o dosador na quantidade correta de acordo com o peso do animal.

Em seguida aplique sobre o fio dorso-lombar de maneira uniforme, no sentido da cauda para cabeça do animal.

## CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO:

Usar protetor ocular. O produto é irritante para os olhos. Ocorrendo contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente.

Use Máscaras cobrindo o nariz e a boca. O produto é perigoso se inalado ou aspirado. Caso haja inalação ou aspiração, procure local arejado.

Use luvas de borracha, macacão com mangas compridas, avental impermeável e botas. O produto é irritante e/ou absorvível pela pele.

Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente.

## ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

### BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 24 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

## PRECAUÇÕES:

Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto;

Não utilize equipamento com vazamento;

Não desentupa bicos, orifícios e válvula com a boca;

Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas;

Não aplique o produto contra o vento;

Não contamine coleções de água de qualquer maneira;

Os piretroides são tóxicos para peixes, anfíbios, pássaros e abelhas.

Cuidado para não contaminar lagos ou cursos d'água.

Não guardar ou aplicar o produto junto de alimentos, medicamentos, bebidas, produtos de higiene e domésticos.

Não utilizar a embalagem vazia. Eliminar com segurança, evitando contaminar o meio ambiente.

Evitar o contato com o produto, usar luvas de borracha para aplicação do produto.

Se ocorrer contato do produto com a pele ou mucosa, a área deverá ser lavada em água corrente abundante.

## MEDIDAS DE URGÊNCIA A SEREM ADOTADAS EM CASO DE ACIDENTE:

Em caso de acidente remover a roupa atingida e lavar a pele, os olhos e as partes do corpo em contato com o produto com água corrente, em abundância e sabão.

Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente um médico, levando consigo o rótulo do produto.

## ANTÍDOTO:

Não há antídoto específico para cipermetrina ou butóxido de piperonila, em caso de intoxicação o tratamento deve ser sintomático.

Procurar orientação médica.

## MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

## APRESENTAÇÃO:

Frasco plástico contendo 1 litro ou 5 litros.

## MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

## NÃO USE A EMBALAGEM VAZIA.

## CUIDADO, VENENO!



## VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.458 em 08/07/1998.

## RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP nº 11.427

## PROPRIETÁRIO:

Syntec do Brasil Ltda

Estrada Rosa Scarpa, 178 – Votuparim

Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06513-010

CNPJ: 02.177.011/0001-77

Indústria Brasileira

## FABRICANTE:

Vansil Indústria Comércio e Representações Ltda.

Rua João Augusto Cirelli, 640

Distrito Industrial - Descalvado/SP

CEP: 13690-000

CNPJ: 50.472.547/0001-68

Indústria Brasileira