

Gentomicin Mastite

250 mg

Gentamicina Intramamária

Ação: Antibiótico para vacas em lactação.

USO VETERINÁRIO

Composição

Cada 10 g contém:

Sulfato de Gentamicina.....425 mg
(correspondente a 250 mg de Gentamicina base)

Veículo q.s.p.....10 g

Indicações de uso: Tratamento da mastite aguda e crônica de vacas em lactação de baixa e média produção, causadas por *Staphylococcus aureus* (coagulase negativa e positiva), *Streptococcus agalactia e*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Escherichia coli e Enterococcus sp*, sensíveis a gentamicina.

- Importante: o exame bacteriológico do leite constitui a melhor evidência de que a mastite foi realmente curada. Este exame deve ser realizado aproximadamente três semanas após o último tratamento.

Farmacologia e Toxicologia: A Gentamicina é rapidamente absorvida, atingindo altas concentrações sanguíneas entre 1 e 3 horas após a sua administração. A droga atravessa a barreira placentária. Concentrações urinárias são atingidas após 24 horas.

A meia vida plasmática da droga varia de acordo com a espécie (3 a 5 horas) e as concentrações plasmáticas variam conforme a dose administrada. A biodisponibilidade é de 30 - 40 %.

Aplicação e Posologia: Ordenhar a fundo o quarto afetado, para a completa eliminação de pus, matéria em decomposição e leite residual. Lavar e enxugar o úbere, desinfetando as tetas. Injetar através da teta o conteúdo de um aplicador em cada quarto. Fazer leves massagens de baixo para cima a fim de facilitar a difusão do produto. Administrar 1 aplicador de gentamicina 250 mg em cada teta afetada, 1 vez ao dia, durante 3 dias, dependendo da severidade clínica do caso.

Observação: A posologia pode ser alterada a critério do médico veterinário. Recomenda-se a continuidade do tratamento por período de tempo não inferior a 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

Contraindicações: Este produto é contraindicado para vacas com histórico de reações de sensibilidade a qualquer um de seus componentes ou a outros aminoglicosídeos.

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA

BOVINOS - LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO 96 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO O LEITE DEVE SER DESCARTADO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO

Efeitos Colaterais: Animais em tratamento de dermatoses com gentamicina normalmente não requerem a descontinuidade do tratamento. Não há nenhuma evidência de irritação ou sensibilidade.

Apresentação: Seringa de plástico com 10 g do produto e aplicador, acondicionados em cartucho individual ou com 20 unidades.

Deve-se conservar o produto em local seco e fresco (temperatura entre 15° e 30°C), ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 8.236 em 24/04/2002

Responsável Técnico: Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP n° 11.427

Proprietário e Fabricante

Syntec do Brasil Ltda.

Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim

Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06513-010

CNPJ: 02.177.011/0001-77

INDÚSTRIA BRASILEIRA