

# Gliocide®

## Desinfetante e eliminador de odores

### FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:  
Cloro de benzalcônio ..... 2,0 g  
Gloxal ..... 0,7 g  
Veículo q. s. p. .... 100 mL

### INDICAÇÕES:

GLIOCIDE® é indicado como desinfetante e desodorizante para uso em canis e gatis. Apresenta um amplo espectro germicida, abrangendo bactérias gram-positivas, gram-negativas e esporos, fungos e vírus.

### DOSAGENS:

GLIOCIDE® deve ser diluído em água na proporção de 1 mL do produto para cada 400 mL de água (1:400)

### DOSAGENS PRÁTICAS

VOLUME DE GLIOCIDE	VOLUME DE ÁGUA
5 mL	2 Litros
10 mL	4 Litros
25 mL	10 Litros
50 mL	20 Litros

### INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - Antes de proceder à desinfecção recomenda-se a lavagem prévia das instalações ou utensílios a serem desinfetados para reduzir a matéria orgânica e gordura que podem inibir a ação do produto.
- 2 - Para assegurar uma maior eficácia do produto, preparar uma solução desinfetante diariamente, se possível, no momento do uso. Não utilizar soluções preparadas no dia anterior.
- 3 - Retire a tampa do dosador, mantendo a tampa do frasco fechada.
- 4 - Pressione o frasco, visualizando o volume a ser utilizado.
- 5 - Adicionar o produto diretamente na água, agitando bem, até sua completa dissolução.
- 6 - Aplicar essa solução na proporção de 1 litro para 3 metros quadrados de área ser desinfetada.
- 7 - A solução desinfetante deve ser permanecer em contato com as superfícies a serem desinfetadas por um período mínimo de 15 minutos, não havendo a necessidade de ser removido após esse período.

### PRECAUÇÕES:

GLIOCIDE em solução concentrada pode ser irritante para pele e mucosas. Ao manipular o produto, use luvas impermeáveis e evite o contato do mesmo com os olhos, pele ou roupas. Havendo contato, lavar com água corrente e procurar orientação médica, levando consigo a embalagem do produto. Em caso de ingestão acidental, procurar um médico imediatamente.

O contato direto dos animais com o produto concentrado pode causar intoxicações e irritação na pele dos mesmos, principalmente em gatos. Os sintomas em caso de ingestão do produto são náuseas, vômitos, insônia, fraqueza, dispnéia, convulsões e coma. Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente o Médico Veterinário.

Somente para o uso em instalações e utensílios. Não aplicar o produto ou a solução desinfetante nos animais.

- Não usar o produto em presença de sabões e outros detergentes aniônicos e nitratos, pois estes podem diminuir sua eficácia.

- Não reutilizar a embalagem vazia. Descartá-la de forma segura, evitando contaminar o meio ambiente.

- Produto tóxico para organismos aquáticos. Não descartar a embalagem ou restos do produto em mananciais de água.

### VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

### MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

### MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

### APRESENTAÇÃO:

Frasco plástico contendo 250 mL e frasco dosador contendo 1, 2 ou 5 Litros.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 8.856 em 30/04/2004.

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP n° 11.427

### PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Syntec do Brasil Ltda.  
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim  
Santana de Parnaíba/SP  
CEP: 06513-010  
CNPJ: 02.177.011/0001-77  
INDÚSTRIA BRASILEIRA