

Vitapulmin® Gel

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Clenbuterol..... 2,50 mg

Veículo q.s.p. 100,00 mL

INDICAÇÕES:

VITAPULMIN® GEL é indicado somente para equinos no tratamento das enfermidades respiratórias caracterizadas por espasmos bronquiais ou aqueles cuja evolução possa ser influenciada favoravelmente mediante terapia broncoespasmolítica, tais como tosse, dispneia, bronquite subaguda e crônica, bronquiolite, influenza, enfermidade pulmonar crônica obstrutiva (DPOC). Nas obstruções das vias aéreas por muco e quando se desejar aumentar a atividade do epitélio ciliado.

VITAPULMIN® GEL ainda é recomendado para terapia conjunta com antibióticos e/ou sulfonamidas nos casos agudos de bronquiopneumonia e bronquite. Na profilaxia das reações alérgicas dos equinos sensíveis a alérgenos ambientais (pó das baías, da cama de palha, de serragem, de feno velho, de pólen, etc.). Quando indicado como tocolítico, consulte literatura específica a respeito.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Dose básica: 0,8 mg/kg de peso corpóreo, duas vezes ao dia.

VITAPULMIN® GEL: 4 mL para cada 125 kg de peso corporal (um jato completo da seringa dosadora) em 2 doses diárias. Aplicar, de preferência, sobre a ração da manhã e da tarde; se preferir, em animais mansos, aplicar o produto diretamente na boca do animal.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO:

A duração da terapia com VITAPULMIN® GEL depende de muitos fatores relacionados com a enfermidade, sua etiologia, a duração dos processos, o estado geral do animal, fatores estes que somente o Médico Veterinário poderá avaliar. Baseado nos dados de inúmeras experiências clínicas, recomenda-se para os casos agudos e subagudos um tratamento de 10 a 14 dias. Nos casos crônicos, o tratamento deve se estender pelo menos por 4 semanas, até obter a remissão dos sintomas.

Nos pacientes hipersensíveis a alérgenos ambientais, o tratamento pode ser administrado de forma intermitente, ou seja, a cada vez que estiverem submetidos a uma exposição excessiva destes agentes.

Não foi observado nenhum efeito secundário durante a administração por período de meses.

Não se registrou nenhuma influência sobre o apetite e/ou peristaltismo intestinal. A duração do efeito se mantém durante 6-8 horas após uma aplicação única. Após 3 a 5 dias de tratamento, se alcança um "plateau" que permite manter o efeito desejado com duas doses orais diárias durante o tempo necessário.

CONTRAINDICAÇÕES:

Em éguas gestantes, o tratamento deve ser suspenso 2-3 dias antes da data prevista do parto, pois VITAPULMIN® GEL exerce uma ação anticonstritiva sobre a musculatura do útero, podendo desta maneira alterar o transcurso normal do processo.

Não é recomendável o uso de corticosteroide junto com VITAPULMIN® GEL devido aos riscos de potencialização do efeito vasodilatador periférico. O princípio ativo de VITAPULMIN® GEL antagoniza os efeitos da ocitocina e da prostaglandina F2α.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta. Quando aberto, o frasco deve ser conservado em local limpo, por um período máximo de 3 meses.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

APRESENTAÇÃO:

Frasco plástico de 500 mL com seringa dosadora.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 7.469 em 19/09/2000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto – CRF/SP n° 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Syntec do Brasil Ltda
Estrada Rosa Scarpa, 178 – Votuparim
Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
Indústria Brasileira



(11) 4702-5425
sac@syntec.com.br
www.syntec.com.br

