

Evigest® Injetável

USO VETERINÁRIO

SUSPENSÃO ESTÉRIL A BASE DE ACETATO DE
MEDROXIPROGESTERONA PARA INIBIÇÃO DO ESTRO
DE CADELAS E GATAS.

Fórmula:

Cada 100mL contém:

Acetato de medroxiprogesterona.....5,00g

Veículo q.s.p100mL

Indicações:

EVIGEST® está indicado na inibição do estro em cadelas e gatas, de acordo com as seguintes situações:

1º- Cadelas e gatas nas quais a procriação ou reprodução envolvam risco de vida para estes animais;

2º- Cadelas e gatas que apresentem riscos cirúrgicos mínimos na ovarió-histerectomia.

3º- Cadelas e gatas cujas ninhadas sejam opcionais.

Posologia:

Cadelas:

PORTE	PESO	DOSE
PEQUENO	até 10kg	1mL
MÉDIO	de 10kg a 20kg	2mL
GRANDE	acima de 20kg	3mL

O tratamento deve ser efetuado na fase de anestro, repetindo com intervalos de 5 a 6 meses.

Gatas:

De 0,50 a 1mL de **EVIGEST®** durante a fase de anestro, repetindo com intervalo de 4 meses.

Qualquer alteração na posologia bem como na frequência das aplicações, fica a critério e sob responsabilidade do Médico Veterinário.

Via de Administração:

A dose indicada deverá ser administrada em uma única injeção subcutânea. Considerando que pode ocorrer uma pequena descoloração temporária do pelo no local da injeção, esta deve ser aplicada numa região pouco visível, como por exemplo: face interna da coxa ou dobra interna do flanco. Para inibição do estro em cadelas, o momento recomendado de **EVIGEST®** é 3 a 5 meses após o período de cio.

Para inibição do estro em gatas, o momento recomendado para administração de **EVIGEST®** é 3 a 4 meses após o período de cio.

Recomenda-se que a fase do ciclo seja verificada com base na anamnese do animal e/ou esfregaço vaginal, antes de ser administrado o produto.

Em animais nos quais se deseja a inibição contínua do estro, a longo prazo, devem ser aplicadas repetidas injeções subcutâneas, nos intervalos recomendados.

Erro no diagnóstico da fase do ciclo estral na qual se encontra o animal pode resultar no retorno do estro,

após um período variável de tempo.

Contraindicações:

EVIGEST® está contraindicado nas seguintes situações:

Nas fases de proestro, estro e metaestro.

Antecedentes de doença geniturinária.

Presença de corrimento vaginal anormal ou persistente. Falsa prenhez.

Outras anormalidades diagnosticadas do sistema endócrino ou reprodutor.

Tumores mamários podem ter seu crescimento estimulado pela atividade progesteronal, portanto, o uso de **EVIGEST®**, na presença destes tumores, devem ser cuidadosamente avaliados pelo Médico Veterinário.

O uso ou aplicações deste produto em seres humanos causa graves riscos à saúde.

Apresentações:

1 frasco ampola de 1 mL acompanhado de 1 seringa com agulha.

MANTENHA ESTE OU QUALQUER OUTRO
MEDICAMENTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E
ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO,
AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº: 6.710
em 08/02/1999

Responsável Técnico:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto

CRF/SP nº 11.427

Proprietário:

Syntec do Brasil Ltda.

Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim

Santana de Parnaíba/SP

CEP: 06513-010

CNPJ: 02.177.011/0001-77

Indústria Brasileira

Fabricante:

Jofadel Indústria Farmacêutica S/A

Av. Dr. José da Frota Vasconcelos, 100

Industrial JK - Varginha/MG

CEP: 37062-500

CNPJ: 17.843.582/0001-70

Indústria Brasileira



(11) 4702-5425
sac@syntec.com.br
www.syntec.com.br