

Oxitetraciclina L.A.

20% Injetável

USO VETERINÁRIO

ANTIBIÓTICO DE AMPLO ESPECTRO COM AÇÃO PROLONGADA

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Oxitetraciclina (cloridrato)..... 20 g

Veículo q.s.p.100 mL

INDICAÇÕES:

Tratamento de infecções locais e sistêmicas em Bovinos e Suínos, causados por germes sensíveis ao fármaco, como:

- Pneumonia / Broncopneumonia / Bronquite: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium pyogenes*, *Haemophilus spp.*, *Coliformes*.
- Artrite / Poliartrites: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix spp.*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.*.
- Leptospirose: *Leptospira spp.*.
- Mastite: *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus cyagalactiae* *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Haemophilus spp.*, *Coliformes*, *Corynebacterium pyogenes*.
- Aborto infeccioso: *Leptospira spp*, *Clamídia spp*.
- Abscessos: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp*.
- Metrite: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Haemophilus spp.*, *E. coli*, *Coliformes*.
- Gastroenterites: *Salmonella spp. E. coli*, *Coliformes*, *Erysipelothrix spp.*, *Corynebacterium pyogenes*.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Dose terapêutica da Oxitetraciclina para Bovinos e Suínos: 20 mg / kg de peso corporal.

Dosagem: 1 mL de produto para cada 10 kg de peso corporal, por via intramuscular profunda.

Dose máxima por ponto de injeção:

Bovinos = 20 mL

Suínos = 10 mL

Intervalos entre doses: dose única

Doses mais altas devem ser divididas em 2 ou mais pontos, a critério do Médico Veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não administrar o produto em vacas produtoras de leite para o consumo humano.

EFEITOS COLATERAIS:

Antibiótico de largo espectro pode possibilitar o aparecimento de patógenos não suscetíveis: Fungos / Leveduras e Bactérias resistentes, provocando distúrbios gastrointestinais. Provoca dor no local de administração. Pode provocar efeitos cardiovasculares, deposição nos dentes e tecidos ósseo, devido à facilidade da oxitetraciclina ligar-se ao cálcio.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS - ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. **LEITE:** ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

SUÍNOS - ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

APRESENTAÇÃO:

Frasco ampola de 20, 50 e 100 mL.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.861 em 24/07/2001.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP nº 11.427

PROPRIETÁRIO:

Syntec do Brasil Ltda.

Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim

Santana de Parnaíba/SP

CEP: 06513-010

CNPJ: 02.177.011/0001-77

Indústria Brasileira

FABRICANTE:

Jofadel Indústria Farmacêutica S/A

Av. Dr. José Frota Vasconcelos, 100

Industrial JK - Varginha/MG

CEP: 37062-500

CNPJ: 17.843.582/0001-70

Indústria Brasileira

