

Presolona[®]

Prednisolona
10 mg

USO VETERINÁRIO

Anti-inflamatório esteroidal

FÓRMULA:

Cada comprimido de 80 mg contém:

Prednisolona (acetato) 10 mg

Excipientes q. s. p. 80 mg

INDICAÇÕES:

Presolona é um anti-inflamatório esteroidal, indicado para uso oral em cães, nos casos de:

- eczemas inespecíficos, queimaduras, dermatites e outras afecções dermatológicas;
- irite, iridocidite, glaucoma secundário, uveíte, coriorretinite e outras afecções dermatológicas;
- urticária, dermatites alérgicas, reações alérgicas, asma brônquica, hipersensibilidade (a pólen e a outros alérgenos);
- miosites, artrites reumatóides, osteoartrites, bursites e outras afecções músculoesqueléticas;
- outras doenças recidivantes e/ou crônicas de etiologia desconhecida (ex.: colite ulcerativa e nefrose).

Nos casos de insuficiência adrenal aguda, Presolona tem seu uso recomendado por interferir no metabolismo dos carboidratos e melhorar a diurese característica da insuficiência adrenal.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Administrado por via oral, nas seguintes doses médias diárias:

- para processos alérgicos: 0,5 a 1,0 mg/kg de peso corporal corporal/dia, ou seja, 1 a 2 comprimidos Presolona para cada 20 kg de peso;

- para imunossupressão: 4mg/kg de peso corporal/dia, ou seja 2 comprimidos de Presolona para cada 5kg de peso;

A dose total diária pode ser fracionada em 2 a 4 administrações (a cada 12 horas ou a cada 6 horas). A dose deve ser determinada individualmente, de acordo com a gravidade do caso, a duração do tratamento e a resposta obtida à medicação.

Quando se lida com corticoides, o tratamento objetiva a obtenção de resultados satisfatórios com a menor dose possível. As doses acima são apenas algumas sugeridas e poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

Geralmente os resultados se evidenciam em 2 a 7 dias (doenças musculoesqueléticas, doenças alérgicas que afetam a pele e o trato respiratório e doenças inflamatórias do globo ocular). Após 7 dias, caso não haja resposta clínica, retornar ao Médico Veterinário.

Uma vez obtida resposta clínica satisfatória, a dose inicial deve ser gradativamente reduzida, até que o estado do animal seja satisfatório ou até que se estabeleça uma dose mínima efetiva de manutenção, nas doenças crônicas (artrite reumatoide).

Nunca interromper tratamentos prolongados sem redução paulatina das doses diárias.

Periodicamente, o animal deverá ser reavaliado para eventual ajuste das doses às necessidades que o caso impõe.

CONTRAINDICAÇÕES:

Em caso de infecções virais.

Em caso de úlcera péptica, úlcera de córnea e síndrome de Cushing.

Monitorar o uso do produto, em casos de osteoporose, predisposição a tromboflebite, hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal e tuberculose ativa.

PRECAUÇÕES:

Caso sejam observados sinais de infecções bacterianas, recorrer à antibioticoterapia, com acompanhamento do Médico Veterinário. A terapia prolongada com agentes corticosteroides deve ser evitada.

Convém monitorar constantemente os pacientes tratados, embora a retenção de sódio e a depleção de potássio não tenham sido observadas quando o produto é utilizado nas doses recomendadas. Caso se observem sintomas de hipopotassemia (hipocalemia), o tratamento deve ser descontinuado e medidas visando o controle dos níveis de potássio instituídos.

Corticosteróides podem induzir o primeiro estágio de parto quando administrado durante o terço final de gestação e podem provocar parto prematuro, distóxico, morte fetal, retenção de placenta e metrite.

Administrado em cadelas, coelhas e fêmeas de roedores durante a gestação, os corticosteroides podem causar aparecimento de fetos com fissura palatina e, em cadelas, podem resultar em anomalias congênitas incluindo deformidades dos membros e anasarca.

EFEITOS COLATERAIS:

Poderá ocorrer alteração dos níveis de enzimas hepáticas, perda de peso, anorexia, polidipsia, poliúria e outros efeitos indesejáveis. Também foram relatados vômitos e diarreias.

A Síndrome de Cushing associada ao uso prolongado ou repetido de corticosteroides tem sido descrita.

APRESENTAÇÃO:

Comprimidos de 80 mg contendo 10 mg de Prednisolona em blister com 10 ou 20 comprimidos.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 8.698 em 04/09/2003.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP n° 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Syntec do Brasil Ltda.

Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votupará

Santana de Parnaíba/SP

CEP: 06513-010

CNPJ: 02.177.011/0001-77

Indústria Brasileira



(11) 4702-5425
sac@syntec.com.br
www.syntec.com.br